

MAT104 Problem Saati

Araş. Gör. İsmail GÜZEL

iguzel@itu.edu.tr

<https://web.itu.edu.tr/iguzel/>

İstanbul Teknik Üniversitesi

Soru 1.

$$f(x, y) = \log_y x, f_x = ?, f_y = ?.$$

$$f(x, y) = \frac{\ln x}{\ln y}$$

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (\ln x)' \cdot \frac{1}{\ln y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln y}$$

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (\ln x (\ln y)^{-1}) = \ln x \frac{\partial}{\partial y} ((\ln y)^{-1}) \\ &= \ln x \cdot (-1) (\ln y)^{-2} \cdot \frac{1}{y} \\ &= \frac{-\ln x}{(\ln y)^2 \cdot y} \quad // \end{aligned}$$

Soru 2.

$$f(x, y) = \int_{y^2}^x \cos(t^2) dt, f_x = ?, f_y = ?, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = ?, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = ?.$$

Leibniz Kuralı (Kalkülüs'ün Temel Teoremi)

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \underbrace{\frac{d}{dx}(x)}_{=1} \cdot \cos(x^2) - \underbrace{\frac{d}{dx}(y^2)}_{=0} \cdot \cos(y^4) = \cos(x^2)$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \underbrace{\frac{d}{dy}(x)}_{=0} \cdot \cos(x^2) - \underbrace{\frac{d}{dy}(y^2)}_{=2y} \cdot \cos(y^4) = -2y \cos(y^4)$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (-2y \cos(y^4)) = (-2) \cos(y^4) - 2y \cdot (-\sin(y^4)) \cdot 4y^3$$

y'ye göre çarpımın türevi

$$= -2 \cos(y^4) + 8y^4 \sin(y^4)$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (-2y \cos(y^4)) = 0$$

x'e göre sabit

Soru 3.

$s(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ fonksiyonunun tüm ikinci mertebeden kısmi türevlerini bulunuz. $s_x = ?$ $s_y = ?$ $s_{xy} = ?$ $s_{yx} = ?$ $s_{xx} = ?$ $s_{yy} = ?$

$$\text{Hatırlama: } \frac{d}{dx} (\tan^{-1} u(x)) = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'(x)$$

$$s_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{-y}{x^2}\right) = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{-y}{x^2} = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$s_{xx} = \frac{2}{2x} \left((-y)(x^2 + y^2)^{-1} \right) = (-y)(-1)(x^2 + y^2)^{-2} \cdot (2x) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} s_{xy} &= \frac{2}{2y} \left((-y)(x^2 + y^2)^{-1} \right) = (-1)(x^2 + y^2)^{-1} + (-y)(-1)(x^2 + y^2)^{-2} (2y) \\ &= \frac{-1}{x^2 + y^2} + \frac{2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-(x^2 + y^2) + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

$$s(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$s_y = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2} = x(x^2 + y^2)^{-1}$$

$$s_{yy} = \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial s}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x(x^2 + y^2)^{-1} \right) = x(-1)(x^2 + y^2)^{-2} (2y) = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\begin{aligned} s_{yx} &= \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial s}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x(x^2 + y^2)^{-1} \right) \\ &= (1)(x^2 + y^2)^{-1} + (x)(-1)(x^2 + y^2)^{-2} (2x) \\ &= \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{-2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad // \\ &\quad (x^2 + y^2) \end{aligned}$$

Soru 4.

$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ fonksiyonu orijinde diferansiyellenebilir mi?

Türevin limit tanımını kullanalım,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \text{ ve } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \quad 1 \neq -1. \text{ Limit Yoktur.}$$

$f'_x(0, 0)$ var olmadığından, $f(x, y)$ orijinde türevlenemez.

- Ⓐ " $f(x, y)$ fark. f_x ve f_y kısmi türevleri açık bir R bölgesinde sürekliler, f fonksiyonu R 'nin her noktasında diferansiyellenebilir."
- Ⓑ $f(x, y)$ fark. (x_0, y_0) 'da diferansiyellenebilir ise f fonksiyonu (x_0, y_0) 'da süreklidir.

Soru 5.

$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = 0 \end{cases}$ fonksiyonu orijinde türevlenebilir mi?

$x = ky^2$ yolu üzerin limite bakalım.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(ky^2, y) \rightarrow (0,0)} \frac{ky^2 \cdot y^2}{(ky^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^4}{(k^2+1)y^4} = \frac{k}{k^2+1}$$

Limit sonucu k 'ya bağlı olduğundan, limit yoktur.

Fonksiyon orijinde sürekli olamaz.

Dolayısıyla türevlenemez. //

Soru 6.

Türevin limit tanımını kullanarak

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} \text{ fonksiyonunun } f_{xy} \text{ } f_{yx} \text{ kısmi}$$

türevlerini orijinde hesaplayınız.

Fonksiyon orijinde türevlenebilir mi?

$$f'_x(0,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,y) - f(0,y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy \left(\frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} \right) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} y \cdot \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} = y$$

$$f'_y(x,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,h) - f(x,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{xh \left(\frac{x^2 - h^2}{x^2 + h^2} \right) - 0}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} x \cdot \frac{x^2 - h^2}{x^2 + h^2} = x$$

f'_x ve f'_y değerleri vardır ve $(0,0)$ etrafında bir açık kümede süreklidirler. (Aslında her yerde süreklidirler.) Dolayısıyla, "türevlenebilir".

Genel olarak $f_{xy} \neq f_{yx}$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(0,k) - f_x(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k}{k} = \textcircled{-1}$$

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_y(k,0) - f_y(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{k} = \textcircled{1}$$

Soru 7.

$z = f(\cos(x - y))$ verilsin. f türevlenebilir fonksiyon olmak üzere $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$ eşitliğinin sağlandığını gösterin.

$$z_x = f'(\cos(x-y)) \cdot (-\sin(x-y)) (1)$$

$$z_{xx} = f''(\cos(x-y)) (-\sin(x-y)) (1) (-\sin(x-y))$$

$$+ f'(\cos(x-y)) (-\cos(x-y)) (1)$$

$$= f''(\cos(x-y)) \sin^2(x-y) - f'(\cos(x-y)) \cos(x-y) \quad (1)$$

$$z_{xy} = f''(\cos(x-y)) (-\sin(x-y)) (-1) (-\sin(x-y))$$

$$+ f'(\cos(x-y)) (-\cos(x-y)) (-1)$$

$$= -f''(\cos(x-y)) \sin^2(x-y) + f'(\cos(x-y)) \cos(x-y)$$

$$2z_{xy} = -2f''(\cos(x-y)) \sin^2(x-y) + 2f'(\cos(x-y)) \cos(x-y) \quad (2)$$

$$z = f(\cos(x-y))$$

$$\begin{aligned} z_y &= f'(\cos(x-y))(-\sin(x-y))(-1) \\ &= f'(\cos(x-y))\sin(x-y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_{yy} &= f''(\cos(x-y))(-\sin(x-y))(-1)\sin(x-y) \\ &\quad + f'(\cos(x-y))\cos(x-y)(-1) \end{aligned}$$

$$= f''(\cos(x-y))\sin^2(x-y) - f'(\cos(x-y))\cos(x-y) \quad (3)$$

$$\Rightarrow z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$$

Soru 8.


$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), x = \cos t, y = \sin t, z = 4\sqrt{t}, \frac{dw}{dt} = ?.$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{dw}{dz} \cdot \frac{dz}{dt}$$

$$= \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} (2x) \cdot (-\sin t) + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} (2y) \cdot \cos t$$

$$+ \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} (2z) \cdot 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

$$= \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2} \left(\underbrace{-x \sin t}_{-\cos t \sin t} + \underbrace{y \cos t}_{\sin t \cos t} + 4z \frac{1}{2\sqrt{t}} \right) = \frac{2}{1+16t} \cdot 16 = \frac{32}{1+16t}$$



Soru 9.

$u(x, t) = \sin(x - at)$ fonksiyonunun Dalgı Denkleml'i'ni $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ sağladığıını gösteriniz $a \in \mathbb{R}$ ve sıfırdan farklı.

$$u_t = \cos(x - at) (-a)$$

$$u_{tt} = -\sin(x - at) (-a) (-a) = -a^2 \sin(x - at)$$

$$u_x = \cos(x - at)$$

$$u_{xx} = -\sin(x - at)$$

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= -a^2 \sin(x - at) - a^2 (-\sin(x - at)) \\ &= -a^2 \sin(x - at) + a^2 \sin(x - at) = 0 \end{aligned}$$


Soru 10.

$f(u, v, w)$ diferansiyellenebilir olsun. $u = x - y, v = y - z, w = z - x$ ise $f_x + f_y + f_z = 0$ sağlandığını gösteriniz.

$$\begin{aligned} f_x &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x \\ &= f_u \cdot 1 + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (-1) = f_u - f_w \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y &= f_u \cdot u_y + f_v \cdot v_y + f_w \cdot w_y \\ &= f_u \cdot (-1) + f_v \cdot (1) + f_w \cdot (0) \\ &= -f_u + f_v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_z &= f_u \cdot u_z + f_v \cdot v_z + f_w \cdot w_z \\ &= f_u \cdot (0) + f_v \cdot (-1) + f_w \cdot (1) \\ &= -f_v + f_w \end{aligned}$$



$$f_x + f_y + f_z = 0_{//}$$

Soru 11.

$w = f(u, v)$ olsun. $u = (x^2 - y^2)/2$ and $v = xy$ verilsin. $f(u, v)$ fonksiyonu Laplace Denklemi $f_{uu} + f_{vv} = 0$ sağladığına göre w fonksiyonunun da Laplace Denklemi $w_{xx} + w_{yy} = 0$ sağladığını gösteriniz.

$$w_x = w_u \cdot u_x + w_v \cdot v_x = f'_u \cdot x + f'_v \cdot y$$

$$w_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} (f'_u \cdot x + f'_v \cdot y)$$

$\frac{\partial}{\partial x} (f'_u \cdot x)$ *çarpımın türevi*

$$= \frac{\partial}{\partial x} (f'_u) \cdot x + f'_u \cdot \frac{\partial}{\partial x} (x) + \frac{\partial}{\partial x} (f'_v) \cdot y + f'_v \cdot \frac{\partial}{\partial x} (y)$$

$\frac{\partial}{\partial x} (y) = 0$

$$= \left(f_{uu} \cdot \underbrace{u_x}_x + f_{uv} \cdot \underbrace{v_x}_y \right) x + f'_u + \left(f_{vu} \cdot \underbrace{u_x}_x + f_{vv} \cdot \underbrace{v_x}_y \right) y$$

$$= x^2 \cdot f_{uu} + xy \cdot f_{uv} + f'_u + xy \cdot f_{vu} + y^2 \cdot f_{vv}$$



$$w_y = w_u \cdot u_y + w_v \cdot v_y = f_u \cdot (-y) + f_v \cdot x = \underbrace{-f_u \cdot y + f_v \cdot x}$$

$$w_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} (-f_u \cdot y + f_v \cdot x)$$

$$= \frac{\partial}{\partial y} (-f_u) \cdot y + (-f_u) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (y) + \frac{\partial}{\partial y} (f_v) \cdot x + f_v \cdot \frac{\partial}{\partial y} (x)$$

$$= (-f_{uu} \cdot \underbrace{u_y}_{-y} - f_{uv} \cdot \underbrace{v_y}_x) \cdot y - f_u + (f_{vu} \cdot \underbrace{u_y}_{-y} + f_{vv} \cdot \underbrace{v_y}_x) \cdot x$$

$$= y^2 \cdot f_{uu} - xy f_{uv} - f_u - xy f_{vu} + x^2 f_{vv}$$

$$w_{xx} + w_{yy} = x^2 f_{uu} + \cancel{xy f_{vv}} + \cancel{xy f_{uv}} + \cancel{y^2 f_{vv}} + \cancel{f_u}$$

$$+ y^2 f_{uu} - \cancel{xy f_{vv}} - \cancel{xy f_{uv}} + \cancel{x^2 f_{vv}} - \cancel{f_u}$$

$$= x^2 (\underbrace{f_{uu} + f_{vv}}_{=0}) + y^2 (\underbrace{f_{uu} + f_{vv}}_{=0}) = 0_{//}$$

Soru 12.

$F(x, y, z) = \sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0$ olsun. $(\pi/2, \pi, \pi)$ noktasında, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ifadesini hesaplayınız.

F fonksiyonu kapalı formdadır.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\cos(x+y) + \cos(x+z)}{\cos(y+z) + \cos(x+z)} = z_x := M(x, y, z)$$

$$z_{xx} = \frac{-M_x}{M_z} \text{ olur.}$$

$$z_{xx} = \frac{(-\sin(x+y) - \sin(x+z))(\cos(y+z) + \cos(x+z)) + \sin(x+z)(\cos(x+y) + \cos(x+z))}{(-\sin(x+z))(\cos(y+z) + \cos(x+z)) + (\sin(y+z) + \sin(x+z))(\cos(x+y) + \cos(x+z))}$$

$$z_{xx} \Big|_{(\pi/2, \pi, \pi)} = 2 \quad //$$

